

## โรคไขเลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



### อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน  
เบื่ออาหาร หน้าแดง  
ปวดศีรษะ อาเจียน

มีผื่น-จุดสีแดง  
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา  
หรือถ่ายอุจจาระดำ



มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด  
มือเท้าเย็น  
ชีพจรเบาและเร็ว

ตับโต ม้ามกดเจ็บ  
บริเวณชายโครงขวา



### การรักษา



ให้ยาลดไข้ 'พาราเซตามอล'  
**ห้ามใช้ยาแอสไพริน**



ควรดื่มน้ำมาก ๆ หรือ  
ดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



หากมีอาการปวดท้อง ซึม  
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ไข้ลด  
**ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที**

### การป้องกัน



หากมีอาการน่าสงสัย  
ควรรีบพบแพทย์



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัด  
ภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ  
และปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบบ้านให้สะอาด



ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง  
หรือติดมุ้งลวดในบ้าน  
และทายากันยุง





# รณรงค์กำจัด ยุงลาย ด้วยมาตรการ

# 3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคคอตีบไอริสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

## เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้สะอาดโปร่ง  
เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ในที่มืด



## เก็บขยะ

เก็บขยะตามภาชนะ  
ทิ้งขยะในถังขยะที่มี  
ถุงพลาสติก



## เก็บน้ำ

เก็บน้ำไม่ให้มีฟอง ไข่ยุงตามภาชนะ  
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้  
ทิ้งน้ำสกปรกที่ทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อ  
หรือเปลี่ยนภาชนะทุกสัปดาห์



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iOS Application "กำจัดลูกน้ำยุงลาย"  
ใช้โปรแกรมฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งบน Android (Play Store)  
และ iOS (App Store) ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์  
ในรายละเอียดการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ของมูลนิธิ



**3 เก็บ** : เก็บบ้าน, เก็บขยะ, เก็บน้ำ

**3 โรค** : โรคไข้เลือดออก, โรคคอตีบไอริสซิกา, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



© มูลนิธิศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บแห่งประเทศไทย